

N°	CODICE (Elab.)		DESCRIZIONE	COLORE
			Unità dei terreni attuali e delle alluvioni Oloceniche	
A	2	2a	Depositi fluviali, fluvio-lacustri e di versante, costituiti da ghiaie, sabbie, limi e argille, in genere poco o per nulla cementati. Depositi di conoide alluvionale, costituiti da ghiaie, sabbie e limi, in genere poco cementati. Depositi di versante, costituiti da detrito eterometrico, a spigoli vivi, in genere poco cementato. Depositi di frana, costituiti da materiale eterometrico, a spigoli vivi, in genere poco cementato. Depositi alluvionali costituiti da limi e depositi palustri ora fini che grossolani.	
			Unità delle alluvioni Pleistoceniche	
B	2	2b	Depositi alluvionali costituiti sabbiosi e limosi a componente limosa, colluviali ed eterometrici fluviotermali, lavi- clastici, talora metallizzate vulcaniali e sulcaniali con intercalazioni di livelli sabbioso-limosi e limoso-argillosi. Depositi sabbioso limosi a componente ghiaiosa, talora cementati, costituiti da ghiaie, sabbie e limi, in genere poco cementati. Lembi isolati alluvionali (Riumbari) ricchi a sedimentazione eolica, di valore paleoclimatico, sono generalmente ben stratificati.	
			Unità vulcanica ignimbritica Miocenica	
C	7	7a	Ignimbriti cineritiche intensamente vesicolate o vetrose nella parte basale (Unità di Monte Ulmo); tufoi saldati a struttura eutaxitica (Unità nelle Tumarelli" Auct.); ignimbriti riolitiche saldate in potenti colati, spesso con livelli vetrosi basali, porfirotipi (Unità di Monte Ulmo); ignimbriti riolitiche saldate in potenti colati, spesso con struttura eutaxitica e/o prfiro di fiusso (Unità di Monte Crisci); ignimbriti riolitiche saldate in potenti colati, spesso con livelli vetrosi basali, porfirotipi (Unità di Serucci); ignimbriti riolitiche, a struttura eutaxitica con frammenti lavici e livelle vetrose basali (Unità di Colonna Vetra).	
			Unità vulcanica piroclastica Miocenica	
D	7	7b	Flussi piroclastici riolitici (Unità d'Pietrapiana); flussi piroclastici cineritico-pomicei latitici riolitici (Unità di Corrusa in Inglosi); flussi piroclastici riolitici cineritico-pomicei (Unità Jannuta, Unità Lentisco e Rocca nel Cervo).	
			Unità detritico alluvionale Miocenica	
E	7	7c	Depositi continentali conglomeratici e marnoso sterilitici prevalenti nei procedenti di clasti di ofioliti e arenarie basaltiche cenozoiche. (Monte Gisai, Su Mandanbiu, Schina Rubia).	
			Unità vulcanica e vulcanica Oligo-Miocenica	
F	7	7d	Lave basaltico-andesitiche in ammassi lenti basaltoidi (Unità di Monte Nicola); lave andesitiche-porfiriche con intercalazioni di livelli piroclastici (a ofioliti di Nuxis (Unità di Punta Bellu); andesiti in ammassi lenti (cupole, necks) (Unità di Monte Arcutu); andesiti porfiriche in colate, necks, filoni e cupole (Unità di Punta Sa Mesa); lave andesitiche in cupole, necks, filoni e colate con intercalazioni brecciose e livelli piroclastici (Unità di Piano Biancu); brecce cavitiche, localmente poligeniche, a clasti andesitici (Unità di Monte Cuccuru Mannu); lave andesitiche, in colate, necks e filoni, e livelli piroclastici (Unità di Monte San Michele Nuraxi); lave andesitiche-a andesitico basaltiche massive o andesitiche porfiriche (Unità di Is Urigus, Unità di Sa Mesa); lave andesitiche, in colate, necks e filoni, e livelli piroclastici (Unità di Piano procedenti (Unità di Genna Maiore); lave andesitiche e andesitico basaltiche porfiriche in ammassi subvulcanici (Unità di Monte Pantas).	

N°	CODICE (Elab.)		DESCRIZIONE	COLORE
			Unità detritico alluvionale Eocenica	
G		8a	Conglomerati poligenici ed eterometrici, arenarie, siltiti, in alternanza irregolari; argilliti e marne talora bituminose nella parte inferiore (Formazione del Cixerri Auct.)	
			Unità detritico carbonatica Eocenica	
H		8b	Calcari cristallini marne, argille calcaree e calcari d'acqua dolce, con intercalazioni banchi di carbone (Formazione del procedenti"), calcari a microforaminiferi (Miliolidee) con sottostanti conglomerati basali (Formazione del Miliolitico")	
			Unità magmatica Paleozoica	
I		11	Filoni di quarzo, porfidi quarziferi, filoni basici; filoni e ammassi di graniti porfirici. "Graniti" Auct.	
			Unità metamorfica superiore Paleozoica	
L		12	Metarenarie a quarziti alternate a metargilliti con livoli lineti di metaconglomerati, metacalcari e metacalcescisti; blili e argilloscisti con associate quarziti (Formazione di Riu Lilloni); metasiltiti, metargilliti grigio, nerastre, metargilliti nere e metacalcari neri (Formazione di Monte Argentu); metargilliti, metasiltiti e metaarenarie a metargilliti e metasiltiti nere con calcescisti (Formazione di Genna Museru, Formazione di Punta Giorgino); metaconglomerati poligenici, metarenarie e metacalcari basiche a metavulcaniti; metarenarie quarzose e metasiltiti grigie in grossi banchi (Formazione di Cabitza); metaconglomerati poligenici, metarenarie grigie e grigio scure talora con strutture sedimentarie e bioturbazioni (Formazione di Riu San Marco); metacalcari compatti parzialmente dolomitizzati, metacalcari a crinoidi e metacalcari a rudisti (Formazione di Fluminimaggiore); filoni di ofiolu argillitico nuovo-violacee (Puddinga") scuri metarenarie, metasiltiti e metargilliti basali verdastri (Formazione di Monte Argentu), metargilliti, metasiltiti e